

# FICHE D'INFORMATION PATIENT

## Buprénorphine



### QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les médicaments de substitution comme la buprénorphine sont prescrits pour la **dépendance aux opioïdes**. Avec un accompagnement médical, psychologique et social, ils permettent d'arrêter la consommation d'héroïne ou autres opioïdes et donc d'en réduire les risques associés.



### VOTRE TRAITEMENT

- SUBUTEX® } voie sublinguale : comprimé à mettre **SOUS** la langue jusqu'à dissolution complète (5 à 10 minutes).
- SUBOXONE® } **Ne pas avaler pendant ce temps, ni boire ni manger.**
- OROBUPRE® } voie orodispersible : lyophilisat à mettre **SUR** la langue jusqu'à dissolution complète (15 secondes).
- **Ne pas avaler pendant 2 minutes, ne pas boire ou manger pendant 5 minutes.**



**ATTENTION !** Les formes sublinguales et orodispersibles **ne sont pas interchangeables**.  
Respectez le mode d'administration de votre traitement.

- **Ne pas avaler directement le médicament**
- **Ne pas faire fondre le médicament dans un verre d'eau**



### QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?



Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors du traitement par buprénorphine sont les suivants : infections, insomnies, céphalées (maux de tête), nausées, vomissements, douleurs abdominales, constipation, sueur excessive, syndrome de sevrage.

**En cas d'effets indésirables, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.**



## LES RISQUES ET DANGERS

- **Conduite de véhicule** : la buprénorphine peut provoquer une somnolence ou des vertiges (en particulier durant les premières semaines de traitement, lors d'une modification de dose, si vous consommez de l'alcool ou prenez des médicaments sédatifs avec la buprénorphine). **Vous ne devez pas conduire, ni utiliser des outils ou machines, ni entreprendre des activités dangereuses tant que vous ne savez pas de quelle manière ce médicament vous affecte.**
- **Autres médicaments** : la prise d'autres opioïdes (méthadone, morphine, oxycodone, fentanyl, héroïne...) et de médicaments indiqués dans la dépendance à l'alcool (naltrexone, nalméfène) est contre-indiquée lors du traitement par buprénorphine. La prise de calmants ou de somnifères, sans avis médical, est dangereuse. **Le risque d'overdose mortelle par dépression respiratoire est augmenté.**
- **Prise d'alcool** : la prise de boissons alcoolisées et même de médicaments contenant de l'alcool est fortement déconseillée pendant le traitement avec la buprénorphine. **Le risque d'overdose mortelle par dépression respiratoire est augmenté.**
- **Injection ou sniff** : en cas d'injection ou de sniff, il y a un risque d'overdose, d'infections, de lésions du foie, de lésions vasculaires ou de lésions des muqueuses nasales.



## PRÉVENTION

- **Kit Exper®** : afin d'éviter tout risque infectieux en cas d'usage de la voie intraveineuse, vous pouvez vous procurer du matériel stérile à usage individuel et unique en pharmacie. Ces kits contiennent des seringues avec aiguilles, de l'eau pour préparation injectable, des lingettes antiseptiques, des filtres universels et en coton, des récipients de chauffe, ainsi que des tampons secs.



- **Prenoxado®** : en cas d'overdose, il existe un antidote sous forme d'injection intramusculaire qui va contrer les effets des opioïdes et en particulier la dépression respiratoire. Ce kit est disponible en pharmacie d'officine sans prescription médicale. Il est important de garder ce kit en permanence sur soi.



## CONTACTS UTILES

- **SAMU** : 15 / **Services d'urgence** : 112
- **Mon médecin** : .....
- **Drogue Info Service** : 0 800 23 13 13
- **Mon pharmacien** : .....