

FICHE AIDE DISPENSATION OFFICINE – TRAITEMENTS D'AMP

Liste non exhaustive

** Prescription réservée à certaines spécialités (gynécologie, gynécologie-obstétrique, endocrinologie et métabolisme...)

SPECIALITÉ	DOSAGE	CONTENU	INJECTION	CONSERVATION
BEMFOLA® **	75 UI/0,125mL 150 UI/0,25mL 225 UI/0,375mL 300 UI/0,5mL 450 UI/0,75mL	Boîte unitaire : stylo pré-rempli	Usage unique - Voie SC - Nécessaire fourni	Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation)
CETROTIDE® ** <u>A reconstituer</u>	0,25mg	Boîte unitaire : flacon poudre + seringue de solvant (1mL)	Usage unique - Voie SC, paroi abdominale inférieure - Nécessaire fourni	Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation) (Sortir 30 minutes avant)
DECAPEPTYL® <u>A reconstituer</u>	0,1 mg <i>Injection quotidienne</i>	Boîte de 7 : flacons poudre + ampoules de solvant (1mL)	Usage unique - Voie SC - Non fourni : 7 seringues (1-2mL), 7 aiguilles pour la reconstitution <u>et</u> l'injection	T<25°C
	3 mg LP <i>LP sur 28 jours</i>	Boîte unitaire : flacon de poudre + ampoule de solvant (2mL).	Usage unique - Voie IM (muscle fessier) - Nécessaire fourni	
ELONVA® **	100 µg 150 µg	Boîte unitaire : seringue pré- remplie	Usage unique - Voie SC - Nécessaire fourni	Réfrigérateur 2-8°C ou max 28j à T < 25°C
FERTISTARTKIT® ** <u>A reconstituer</u>	75 UI 150 UI	Boîte de 5 ou de 10 : flacon poudre et solvant en seringue pré- remplie	Usage unique - Voie SC ou IM - Nécessaire fourni	T < 25°C
	900 UI	Boîte unitaire : flacon poudre et solvant en seringue pré- remplie	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni (12 seringues graduées en UI)	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C Après ouverture : max 28j à T < 25°C

SPECIALITÉ	DOSAGE	CONTENU	INJECTION	CONSERVATION
FOSTIMONKIT® ** <u>A reconstituer</u>	75 UI 150 UI 225 UI 300 UI	Boîte de 5 : flacon poudre et solvant en seringue pré- remplie	Usage unique - Voie SC - Nécessaire fourni	T < 25°C
FYREMADEL® et GANIRELIX® **	0,25 mg /0,5mL	Boîte unitaire ou de 5 : seringue pré- remplie	Usage unique - Voie SC, de préférence dans la cuisse - Nécessaire fourni	T<25°C
GONAL-F® ** <u>A reconstituer</u>	75 UI	Boîte unitaire : flacon poudre et seringue pré- remplie de solvant (1mL)	Usage unique - Voie SC à heure fixe - Non fourni : aiguille pour la reconstitution et l'injection	T < 25°C
	1050 UI	Boîte unitaire : flacon poudre et seringue pré- remplie de solvant (2mL)	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni (15 seringues en unités de FSH)	T < 25°C <i>après ouverture max 28j à T<25°C</i>
	150 UI 300 UI 450 UI 900 UI	Boîte unitaire : stylo pré-rempli	Multidoses - Injection SC à heure fixe - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation) Après ouverture : max 28j à T < 25°C
LUTRELEF® <u>A reconstituer</u>	3,2 mg	Boîte unitaire : flacon poudre et solvant	Auto injecteur LutrePulse® - Nécessaire fourni par le centre d'AMP	T < 25°C - après reconstitution : conservation 3j
LUVERIS® ** <u>A reconstituer</u>	75 UI	Boîte unitaire ou de 3 : Flacon de poudre et de solvant	Usage unique - Voie SC - Non fourni : aiguille pour le reconstitution (22G ou 23G) + 1 aiguille pour injection (25G) + 1 seringue (1-2 mL)	T < 25°C

SPECIALITÉ	DOSAGE	CONTENU	INJECTION	CONSERVATION
MENOPUR® **	75 UI <u>A reconstituer</u>	Boîte de 5 : Flacons poudre + ampoules de solvant	Usage unique - Voie SC ou IM - Non fourni : 5 aiguilles pour la reconstitution et l'injection + 5 seringues (1-2 mL)	T < 25°C
	600 UI <u>A reconstituer</u>	Boîte unitaire : Flacon poudre + seringue pré- remplie de solvant avec aiguille (1mL)	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C Après ouverture : max 28j à T < 25°C
	600 UI 1200 UI	Boîte unitaire : stylo pré rempli	Multidoses - Voie SC (paroi abdominale) - Nécessaire fourni	
ORGALUTRAN® **	0,25 mg/0,5mL	Boîte unitaire ou de 5 : seringue pré remplie	Usage unique - Voie SC, de préférence dans la cuisse - Nécessaire fourni	T<25°C)
OVALEAP® **	300 UI/0,5mL 450 UI/0,75mL 900 UI/1,5mL	Boîte unitaire : Cartouche Commander stylo Ovaleap Pen®	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation) Après ouverture : max 28j à T < 25°C
OVITRELLE® **	250 µg	Boîte unitaire : stylo pré rempli	Usage unique - Voie SC - Nécessaire fourni	Réfrigérateur 2-8°C
PERGOVERIS® **	300/150 UI 450/225 UI 900/450 UI	Boîte unitaire : Stylo pré rempli	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C (Sortir 30min avant) Après ouverture : max 28j à T < 25°C
PUREGON® **	300 UI 600 UI 900 UI	Boîte unitaire : Cartouche Commander stylo Puregon Pen®	Multidoses - Voie SC - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation) Après ouverture max 28j

REKOVELLE® **	12 µg/0,36mL 36 µg/1,08mL 72 µg/2,16mL	Boîte unitaire : Stylo pré rempli	<i>Multidoses</i> - Voie SC - Nécessaire fourni	Avant ouverture : Réfrigérateur 2-8°C ou 3 mois T° < 25°C (dont période utilisation) Après ouverture : max 28j à T < 25°C
SYNAREL®	0,2mg/dose	Solution pour pulvérisation nasale	Flacon (60 doses)	T < 25°C

Nécessaire à fournir, liste non exhaustive :

- **Aiguilles pour la reconstitution (21G, 22G, 23G) ou pour injection IM (21G)**
Aiguille **21G**, verte 40mm : 34010666104904 (ref. 304432) ou 50mm : 3401066105154 (ref.301155)
Aiguille **21G avec seringue** 2mL : 3401565675646 (ref. 303044), boîte de 10
Aiguille **21G avec seringue** 5mL : 3401565676827 (ref.303048), boîte de 10
Aiguille **22G**, noire 40mm : 3401061792823 (ref. 301000)
Aiguille **23G**, bleue 30mm : 3401063346765 (ref.300700)
- **Aiguille pour injection SC (25G)**
Aiguille **25G**, orange : 3401066106335 (ref. 300600)
Aiguille **25G + seringue** 2mL : 3401565676537 (ref. 303032)

+ **Boîte DASRI**

Le matériel supplémentaire (aiguilles, seringues, cotons, alcool, etc.) est à la charge de la patiente.

Facturation médicaments : AMO + AMC **ou** SPEXO (=exo 3)

GONADOTROPHINES : pour stimuler la croissance folliculaire

- **BEMFOLA® , ELONVA® FERTISTARTKIT® , FOSTIMONKIT® , GONAL-F® , LUVERIS®**
MENOPUR® OVALEAP® , PERGOVERIS® , PUREGON® , REKOVELLE®

ANTAGONISTE GnRH : pour prévenir le pic ovulatoire

- **CETROTIDE® , ORGALUTRAN® dont les génériques sont FYREMADEL® et GANIRELIX®**

AGONISTE GnRH : pour prévenir le pic ovulatoire

- **DECAPEPTYL® , LUTRELEF® , SYNAREL®**

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE HUMAINE (hCG) : pour déclencher l'ovulation

- **OVITRELLE®**