



SYNDROME MAIN PIED

SOUS CHIMIOTHÉRAPIE

- Apparition après les 1^{ers} cycles
- Lésions diffuses +/- douleur, brûlure, prurit
- Erythème inflammatoire +/- œdème



SOUS THÉRAPIE CIBLÉE

- Apparition très rapide
- Lésions localisées (zones de contact +++)
- Hyperkératose douloureuse



CONSEILS & ÉDUCATION DU PATIENT



- ✗ Marches prolongées
- ✗ Chaussures trop serrées, matières synthétiques
- ✗ Bains trop chauds
- ✗ Station debout
- ✗ Utilisation de produits abrasifs (gels hydroalcooliques...)



- ✓ Soins podologiques préventifs ou à distance des poussées inflammatoires
- ✓ Porter des chaussettes en coton
- ✓ Porter des gants en coton ou latex

SYNDROME MAIN PIED




NETTOYER EN DOUCEUR

Visage, corps, cuir chevelu, muqueuses externes

NOURRIR & APAISER

Visage, corps, cuir chevelu, muqueuses externes



XERACALM
A.D
PAIN NETTOYANT
SURGRAS



XERACALM
A.D
HUILE LAVANTE
RELIPIDANTE



CICALFATE+
GEL NETTOYANT
ASSAINISSANT



XERACALM
A.D
BAUME RELIPIDANT