

COLLYRES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	NOMBRE DE GOUTTES PAR FLACON	LENTEILLES
Acular 0,5% (5ml)	<b>15 jours</b>	142	⌚
Aflavis 1mg/ml (5ml)	28 jours	100	X
Allergodil 0,05% (6mL)	4 semaines	200	⌚
Alphagan 0,2% (5ml)	4 semaines	142	⌚
Brimonidine 0,2% (5ml)			
Amiriox 0,3mg/ml (3ml)	3 mois	120	⌚
Artelac (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓
Atropine 0,3%; 0,5%; 1% (10ml)	<b>15 jours</b>	200	⌚
Azarga 10mg+5mg/ml (5 ml)	4 semaines	100	⌚
Brinzolamide / Timolol (5ml)			
Azopt (5ml)	4 semaines	161	⌚
Brinzolamide (5ml)			
Azyter (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X
Biocidan 0,1mg/0,4ml (10 ml)	4 semaines	200	X
Cartéol non LP 1% et 2% (3ml)	4 semaines	60	⌚ Risque intolérance
Cartéol LP 1% et 2% (3ml)			
Cartéol non LP (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	
Cationorm émulsion (10 ml)	3 mois	345	✓
Celluvisc (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	⌚
Chibrocadron (5ml)	<b>15 jours</b>	150	X
Chibroxine 0,3% (5ml)	<b>15 jours</b>	156	⌚
Ciclosporine 1 % (Prép hop 8ml)	4 semaines	160	X
Ciloxan 0,3% (5ml)	<b>15 jours</b>	<b>156</b>	X
Combigan 2mg+5mg/ml (5ml)	4 semaines	100	⌚
Brimonidine / Timolol (5ml)			
Cosidime (5ml)	4 semaines	100	Pas d'étude ⌚
Cosopt (5 ml)			
Dorzolamide / Timolol (5ml)			
Costec (10ml)	2 mois	333	Pas d'étude

COLLYRES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	NOMBRE DE GOUTTES PAR FLACON	LENTEILLES
Cromabak 2% (10ml)	8 semaines	200	✓
Cromofree 2% (10ml)	3 mois	200	X
Cromoptic 2% (10ml)	30 jours	200	⌚
Cromoptic (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	⌚
Dexafree 1mg/ml (UD)	<b>UD sortie du sachet : 15 j</b>	Unidose	X
Dexocol 1mg/ml (6ml)	4 semaines	120	X
Dualkopt (10ml)	2 mois	250	Pas d'étude
Dulci-larmes 1,5% (10ml)	3 mois	200	X
Dulci-larmes (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓
Duot trav (2,5ml)	4 semaines	50	⌚
Travoprost / Timolol			
Ecbirio 0,3mg+5mg (3ml)	3 mois	120	⌚
Elixya (10ml)	2 mois	269	✓
Excine 0,3 % (5 ml)	<b>15 jours</b>	100	⌚
Filiop (2,5ml)	4 semaines	50	⌚
Fixapost (6ml)	3 mois	190	⌚
Flucon (3ml)	4 semaines	60	⌚
Fluidabak 1,5% (10ml)	12 semaines	150	✓
Frakidex (5ml)	<b>15 jours</b>	100	X
Ganfort 0,3mg+5mg/ml (3ml)	4 semaines	60	⌚
Bimatoprost / Timolol			
Ganfort 0,3mg+5mg/ml (UD)	<b>UD sortie du sachet : 7 j UD dans le sachet : 10 j</b>	Unidose	⌚
Gel-larmes (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	⌚
Geltim LP 1mg/g (UD)	<b>UD dans le sachet : 15 j</b>	Unidose	Pas d'étude
Hylo confort et confort + (10ml)	6 mois	300	✓
Hylo Lipid (3ml)			
Hylovis Multi (ou gel)			
Hylovis (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓

Même code couleur = équivalent, générique ou hybride / \* A conserver au réfrigérateur avant ouverture  
 ⌚ : Attendre 15 minutes avant mise en place des lentilles / △ Le port de lentilles reste déconseillé en cas d'infection  
 Collyres & Pommades – Gouttes et conservation - @FG 11.2024

COLLYRES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	NOMBRE DE GOUTTES PAR FLACON	LENTEILLES
Ikervis (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	Pas d'étude
Indocollyre 0,1% (5ml)	<b>15 jours</b>	150	X
Iopidine 0,5% (5ml)	4 semaines	100	⌚
Isopto-pilocarpine 2 % (10ml)	<b>15 jours</b>	300	⌚
Ketazed 0,25mg/ml (10ml)	3 mois	363	Pas d'étude
Kilatim 50+5mg/ml (2,5 ml)	<b>4 semaines</b>	80	⌚
Kivizidiale (2,5ml)	<b>4 semaines</b>	50	⌚
Lacrifluid (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X
Larmes artificielles (10 ml)	<b>15 jours</b>	250	⌚
Levofree 0,05 % (5ml)	3 mois	100	X
Levofree (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	
Levophpta 0,05% (5mL)	30 jours	166	⌚
Lumigan 0,1mg/mL (3mL)	<b>4 semaines</b>	120	⌚
Bimatoprost 0,1mg/mL (3mL)			
Lumigan 0,3 mg/mL (3mL)	<b>4 semaines</b>	120	⌚
Bimatoprost 0,3mg/mL (3mL)			
Maxidrol (3ml)	<b>15 jours</b>	60	⌚
Monokéto 0,25mg/ml (UD)	Après ouverture sachet : 3 mois	Unidose	⌚
Monoox (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X
Monoprost 50mg/ml (UD)	<b>UD sachet ouvert : 10 j</b>	Unidose pour 2 yeux	⌚
Monosept (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X
Multicrom 2% (10ml)	8 semaines	200	✓
Mydriaticum 2mg/0,4ml (UD)	Unidose	<b>8</b>	⌚
Naabak 4,9% (10 ml)	3 mois	200	✓
Naabak (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓
Naaxia (10ml)	4 semaines	400	⌚
Neosynephrine 5 % (5ml)	<b>15 jours</b>	125	X
Neosynephrine 10 % (5ml)	<b>15 jours</b>	125	X

COLLYRES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	NOMBRE DE GOUTTES PAR FLACON	LENTEILLES	
Neovis total (10ml)	4 mois	280	✓	
Nereya (10ml)	6 mois	250	⌚	
Nutrivic 5 % ( 10ml)	4 semaines	200	⌚	
Ocufen (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X	
ODM 5 (10 ml)	3 mois	180	X	
Opatanol 1mg/ml (5 ml)	<b>4 semaines</b>	100	⌚	
Opticron 2 % (5ml)	<b>15 jours</b>	100	⌚	
Opticron (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	⌚	
Optive ou Optive fusion (10 ml)	3 mois	240	✓	
Quinofree (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	X	
Refresh (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓	
Rifamycine 1 % (10ml)	<b>15 jours</b>	200	X	
Simbrinza (5ml)	4 semaines	100 gouttes	⌚	
Skiacol 0,5 % (UD)	Unidose	<b>14</b>	⌚	
Systane : Balance ou Ultra (10ml)	6 mois	240	✓	
Théalose	3 mois	300 (10 ml) 450 (15ml)	✓	
Timabak 0,5 % (5ml)	8 semaines	100	Risque intolérance	
Timolol 0,5 % (5ml)	4 semaines	50		
Timoptol LP 0,25 % (2,5ml)				
Timoptol LP 0,5 % (2,5ml)				
Tobradex (5ml)	4 semaines	100	⌚	
Todexal Gé (5ml)				
Tobrex 0,3% (5ml)				
Tobrabact 0,3% (5ml)				
Travatan 40 mg/ml (2,5ml)	4 semaines	90	⌚	
Travoprost Sdz (2,5ml)				
Trusopt 20mg/ml (5ml)	4 semaines	130	⌚	
Dorzolamide Bgr (5ml)				
Vismed Multi (ou gel)	6 mois	250 (10ml) 375 (15ml)	✓	

Même code couleur = équivalent, générique ou hybride / \* A conserver au réfrigérateur avant ouverture  
 ⌚ : Attendre 15 minutes avant mise en place des lentilles / △ Le port de lentilles reste déconseillé en cas d'infection  
 Collyres & Pommades – Gouttes et conservation - @FG 11.2024

COLLYRES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	NOMBRE DE GOUTTES PAR FLACON	LENTILLES
Vismed (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	✓
Vitabact 0,05% (10ml)	1 mois	250	X
Vizit trav 40mg/ml (2,5ml)	4 semaines	50	⌚
Voltaren-ophtabak 1mg/ml (10ml)	8 semaines	200	X
Xalacom 50+5mg/ml (2,5 ml) *	4 semaines	80	⌚
Latanoprost / Timolol (2,5ml) *			
Xalatan 0,05 % (2,5ml)	4 semaines	80	⌚
Latanoprost (2,5ml) *			
Xiop 50µg/ml *	Après ouverture sachet : 7 jours	Unidose	⌚
Yellox 0,9ml/ml (5ml)	4 semaines	136	X
Zalerg 0,25mg/ml (5ml)	3 mois	150	⌚
Zalerg (UD)	Jeter immédiatement	Unidose	⌚

POMMADES OPHTALMIQUES	CONSERVATION APRÈS OUVERTURE	LENTILLES
Aquarest	4 semaines	⌚
Blephagel	4 semaines	✓
Cidermex	15 jours	X
Ciloxan	4 semaines	X
Frakidex	4 semaines	X
Fucithalmic	15 jours	X
Gel-larmes	4 semaines	X
Lacrifluid gel	4 semaines	X
Lacrigel	4 semaines	Sur avis ophtalmo
Lacryvisc	4 semaines	⌚
Maxidrol	15 jours	X
Rifamycine	15 jours	X
Sterdex	4 semaines	X
Tobrex	15 jours	X
Vitamine A pommade	4 semaines	X

Même code couleur = équivalent, générique ou hybride / \* A conserver au réfrigérateur avant ouverture  
 ⌚ : Attendre 15 minutes avant mise en place des lentilles / △ Le port de lentilles reste déconseillé en cas d'infection  
 Collyres & Pommades – Gouttes et conservation - @FG 11.2024